



TIGNOLA MONITORAGGIO E LOTTA INTEGRATA

MARZO



 **TRAPTEST®**

Installare le Traptest in pre-fioritura e alle prime catture valutare la soglia di intervento

APRILE

1° VOLO **Generazione antofaga**
Fine Marzo-Maggio con picchi nella seconda metà di Aprile

Soglia di intervento:
Olive da olio: > 30-35% dei fiori attaccati
Olive da tavola: > 15-20% dei fiori attaccati

 **DiPel® DF** oppure 

MAGGIO

2° VOLO **Generazione carpofaga**
fine Maggio-Giugno con picchi verso la metà di Giugno

Rogor®
400 ST

Alla fase fenologica di drupa grano di pepe (circa al 50% della schiusa)

Soglia di intervento:
10-15% di larvette in penetrazione (olive infestate)

LUGLIO

DOSAGGI	PRODOTTO	DOSE
CONTRO TIGNOLA	ROGOR 400 ST	80-100 ml/hl (0,96- 1,2 l/ha)
	DIPEL DF	60-80 gr/hl (600-800 g/ha)
	KAIMO SORBIE	15-20 g/hl (150-300 g/ha)

MOSCA MONITORAGGIO E LOTTA INTEGRATA


 **DACOTRAP®**  **CROMOTRAP®**

CON FEROMONE
Soglia di intervento:
presenza significativa di mosca

CROMOTROPICA
(può essere innescata con feromone e attrattivo)
Soglia di intervento:
4-5 femmine per trappola per settimana

- ✓ Posizionare 2-3 trappole/ha per Dacotrap
4-5 trappole/ha per Cromotrap
- ✓ Attaccare le trappole ad altezza uomo, esternamente alla chioma, con orientamento sud-sud ovest
- ✓ Sostituire gli erogatori di feromone ogni 4-5 settimane
- ✓ Con le catture oltre la soglia di intervento: valutare ogni settimana, dalla fase di ingrossamento frutti, la percentuale di infestazione attiva su campioni di 100 drupe (10 drupe a caso su 10 piante)

- Al superamento delle seguenti soglie di drupe infestate:
- 5-10% per olive da olio
 - 1-3% per olive da tavola

Rogor®
400 ST oppure 

LUGLIO

DOSAGGI	PRODOTTO	DOSE
CONTRO MOSCA	ROGOR 400 ST	80-100 ml/hl (0,96- 1,2 l/ha)
	NUPRID SUPREME SC	52-62 ml/hl (0,6-0,8 l/ha)

PRE FIORITURA

Fine Aprile- inizio Maggio

TRI-BASE[®]
Dose: 500-600 ml/hl

OPPURE

Pasta Siapa[®]
Dose: 350 ml/hl

+

Siapton[®]10L
Dose: 300-400 ml/hl

+

Manni-Plex Boro

In presenza di
COCCINIGLIA

**Admiral[®]
GOLD**

TIGNOLA

monitoraggio e lotta integrata



TRAPTEST[®]

Nel mese di
Marzo

DiPel[®] DF **KAIM[®]**
by SORBIL

Aprile-Maggio:
(1 volo generazione antofaga)

POST ALLEGAGIONE

Inizio Giugno

TRI-BASE[®]
Dose: 500-600 ml/hl

OPPURE

Pasta Siapa[®]
Dose: 350 ml/hl

+

Siapton[®]10L
Dose: 300-400 ml/hl

+

Manni-Plex Boro

Giugno-Luglio:
Il volo generazione carpofaga

DiPel[®] DF

OPPURE

**Rogor[®]
400 ST**

ACCRESCIMENTO DRUPE

Agosto - Settembre

TRI-BASE[®]
Dose: 500-600 ml/hl

OPPURE

Pasta Siapa[®]
Dose: 350 ml/hl

+

Manni-Plex K

OPPURE

Manni-Plex Ca

In presenza di
MOSCA

**Rogor[®]
400 ST**

OPPURE

**Nuprid Supreme[®]
SC**

POST RACCOLTA

Fine Novembre

TRI-BASE[®]
Dose: 500-600 ml/hl

OPPURE

Pasta Siapa[®]
Dose: 350 ml/hl

+

Siapton[®]10L
Dose: 300-400 ml/hl

