

TIGNOLA

MONITORAGGIO E LOTTA INTEGRATA

MARZO



 **TRAPTEST**[®]

Installare le Traptest in pre-fioritura e alle prime catture valutare la soglia di intervento

APRILE

1° VOLO **Generazione antofaga**
Fine Marzo-Maggio con picchi nella seconda metà di Aprile

Soglia di intervento:
Olive da olio: > 30-35% dei fiori attaccati
Olive da tavola: > 15-20% dei fiori attaccati

 **BioBit**[®] DF oppure 

MAGGIO

2° VOLO **Generazione carpofaga**
fine Maggio-Giugno con picchi verso la metà di Giugno

Dacol L 40st[®] **Alla fase fenologica di drupa grano di pepe (circa al 50% della schiusa)**

Soglia di intervento:
10-15% di larvette in penetrazione (olive infestate)

LUGLIO

DOSAGGI CONTRO TIGNOLA

PRODOTTO	DOSE
DACOL L 40 ST	80-100 ml/hl (0,96 - 1,2 l/ha)
BIOBIT DF	60-80 gr/hl (600-800 g/ha)
KAIMO SORBIE	15-20 g/hl (150-300 g/ha)

MOSCA

MONITORAGGIO E LOTTA INTEGRATA

 **DACOTRAP**[®]  **CROMOTRAP**[®]

CON FEROMONE
Soglia di intervento:
presenza significativa di mosca

CROMOTROPICA
(può essere innescata con feromone e attrattivo)
Soglia di intervento:
4-5 femmine per trappola per settimana

- ✓ Posizionare 2-3 trappole/ha per Dacotrap
4-5 trappole/ha per Cromotrap
- ✓ Attaccare le trappole ad altezza uomo, esternamente alla chioma, con orientamento sud-sud ovest
- ✓ Sostituire gli erogatori di feromone ogni 4-5 settimane
- ✓ Con le catture oltre la soglia di intervento: valutare ogni settimana, dalla fase di ingrossamento frutti, la percentuale di infestazione attiva su campioni di 100 drupe (10 drupe a caso su 10 piante)

Al superamento delle seguenti soglie di drupe infestate:

- 5-10% per olive da olio
- 1-3% per olive da tavola

Dacol L 40st[®] oppure 

DOSAGGI CONTRO MOSCA

PRODOTTO	DOSE
DACOL L 40 ST	80-100 ml/hl (0,96 - 1,2 l/ha)
NUPRID SUPREME SC	52-62 ml/hl (0,6-0,8 l/ha)

PRE FIORITURA

Fine Aprile- inizio Maggio

 **CUPROXAT^{SDI}**
Dose: 500-600 ml/hl

OPPURE

 **Pasta Caffaro[®]**
Dose: 350 ml/hl

+

 **HUMOZON[®] 10 L**
Dose: 300-400 ml/hl

+

Manni-Plex Boro
Dose: 200-300 ml/hl

In presenza di
COCCINIGLIA

 **Juvinal[®]**
GOLD
Dose: 25-30 ml/hl

POST ALLEGAGIONE

Inizio Giugno

 **CUPROXAT^{SDI}**
Dose: 500-600 ml/hl

OPPURE

 **Pasta Caffaro[®]**
Dose: 350 ml/hl

+

 **HUMOZON[®] 10 L**
Dose: 300-400 ml/hl

+

Manni-Plex Boro
Dose: 200-300 ml/hl

ACCRESCIMENTO DRUPE

Agosto - Settembre

 **CUPROXAT^{SDI}**
Dose: 500-600 ml/hl

OPPURE

 **Pasta Caffaro[®]**
Dose: 350 ml/hl

+

Manni-Plex K
Dose: 400-600 ml/hl
OPPURE

Manni-Plex Ca
Dose: 150-200 ml/hl

POST RACCOLTA

Fine Novembre

 **CUPROXAT^{SDI}**
Dose: 500-600 ml/hl

OPPURE

 **Pasta Caffaro[®]**
Dose: 350 ml/hl

+

 **HUMOZON[®] 10 L**
Dose: 300-400 ml/hl

TIGNOLA - Monitoraggio e lotta integrata

Marzo


TRAPTEST[®]

Aprile-Maggio:
Il volo gen. antofaga

 **BioBit[®] DF**
Dose: 60-80 ml/hl
OPPURE
KAIM[®]
SORBIE
Dose: 15-20 ml/hl

Giugno-Luglio:
Il volo gen. carpofaga

 **BioBit[®] DF**
Dose: 60-80 ml/hl
OPPURE
Dacol[®]
L 40ST
Dose: 80-100 ml/hl

In presenza di
MOSCA

Dacol[®]
L 40ST
Dose: 80-100 ml/hl

OPPURE


Nuprid[®] Supreme
SC
Dose: 52-62 ml/hl

